



بررسی شیوع سقط و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت استان زنجان طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زهرا خالقی*، مامایی، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت بهداشت، narjes313eye@yahoo.com
شیرین بخشی، پزشک عمومی، دکتری حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت بهداشت،
شهناز زمانی، مشاوره در مامایی، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت بهداشت،
زهرا اسلامی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس ارشد، علوم پزشکی زنجان، معاونت بهداشت



چکیده

مقدمه: سقط جنین یک پدیده پزشکی-اجتماعی است که در اکثر کشورهای جهان هنوز بر سر آن بحث و مناقشه وجود دارد. دسترسی به عوامل مرتبط با سقط جهت برنامه ریزی برای کاهش تعداد موارد سقط و بهبود سلامت زنان ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سقط و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت استان زنجان طی سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که از طریق بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت استان زنجان طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته در دو بعد جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با سقط در ۸ شهرستان تابعه استان جمع آوری با شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون کای دو با نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ جمعاً ۲۱۶۷ مورد سقط در سامانه ثبت شده است. بر این اساس شیوع کلی سقط در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۰۶٪ و ۷.۳۷٪ بود. شیوع سقط زودرس (زیر ۱۲ هفته بارداری) در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۵.۶۴٪ و ۵۹.۲۵٪ درصد بود. بیشترین درصد سقط در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب در شهرستان‌های خدابنده (۱۰.۳۱٪) و خرمدره (۸.۹۹٪) و کمترین درصد شیوع در هر دو بازه زمانی ذکر شده در سلطانیه با (۶.۰۱٪) و (۴.۸۱٪) درصد بود، در این سالها فراوانی سقط در مناطق شهری و روستایی به نسبت مساوی بود. بارداری ناخواسته با شیوع ۱۳.۴۳٪ در سال ۱۳۹۹ و ۱۲.۳٪ در سال ۱۴۰۰ از مهمترین دلایل سقط ثبت شده بود. میانگین سنی زنان دارای حداقل یک مورد سقط جنین در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰.۳۳ سال و ۲۹.۵۸ سال بود. بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری کرد شیوع سقط در طی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش جزئی داشت با توجه به اهمیت مقوله جوانی جمعیت در کشور و مرتبط بودن بارداری ناخواسته با میزان سقط در هر دو بازه زمانی برنامه ریزی جهت کاهش بارداری ناخواسته خصوصاً در زنان نیازمند مراقبت و توجه ویژه ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: سقط، سقط زودرس، بارداری ناخواسته

نتایج و بحث:

در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ جمعاً ۲۱۶۷ مورد سقط در سامانه ثبت شده است. بر این اساس شیوع کلی سقط در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۰۶٪ و ۷.۳۷٪ بود. شیوع سقط زودرس در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۵.۶۴٪ و ۵۹.۲۵٪ درصد بود. در این سالها فراوانی سقط در مناطق شهری و روستایی به نسبت مساوی بود. بارداری ناخواسته با شیوع ۱۳.۴۳٪ در سال ۱۳۹۹ و ۱۲.۳٪ در سال ۱۴۰۰ از مهمترین دلایل سقط ثبت شده بود. میانگین سنی زنان دارای حداقل یک مورد سقط جنین در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰.۳۳ سال و ۲۹.۵۸ سال بود. می‌توان نتیجه‌گیری کرد شیوع سقط در طی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش جزئی داشت با توجه به اهمیت مقوله جوانی جمعیت در کشور و مرتبط بودن بارداری ناخواسته با میزان سقط در هر دو بازه زمانی برنامه‌ریزی جهت کاهش بارداری ناخواسته خصوصاً در زنان نیازمند مراقبت و توجه ویژه ضروری می‌باشد.


منابع

- [Moradinazar .M Najafi F, Moradi Nazar Z "Lifetime Prevalence of Abortion and Risk Factors in Women: Evidence from a Cohort Study"](#)pubmed DOI: [10.1155/2020/4871494](https://doi.org/10.1155/2020/4871494)
- Neuman ME, Simonovich SD, Amer K. Exploring the protective effects of judaism on risky behaviors in college students: a pilot study. J Pediatr Nurs. 2019;49:79-84. [DOI:10.1016/j.pedn.2019.09.003]
- شجاعی ج، عرفانی آ، "شواهد تازه از سقط جنین عمدی در شهر تهران: میزان ها، دلایل و تغییرات"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، سال بیست و هشتم شماره ۱ (پیاپی ۷۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹)


مقدمه:

سقط جنین یک پدیده پزشکی-اجتماعی است که در اکثر کشورهای جهان هنوز بر سر آن بحث و مناقشه وجود دارد. دسترسی به عوامل مرتبط با سقط جهت برنامه ریزی برای کاهش تعداد موارد سقط و بهبود سلامت زنان ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سقط و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت استان زنجان طی سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شد.

نمودار شماره ۱: درصد شیوع سقط در شهرستانهای استان زنجان سال ۱۴۰۰



نمودار شماره ۲: درصد شیوع سقط در شهرستانهای استان زنجان سال ۱۳۹۹



مواد و روش‌ها:

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که از طریق بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت استان زنجان طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته در دو بعد جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با سقط در ۸ شهرستان تابعه استان جمع آوری با شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون کای دو با نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.